

STENOKARDIJA – oboljenje koje karakterišu bolovi različitog intenziteta i trajanja u vidu napada u predelu srca.

Postoji nekoliko kliničkih oblika: stenokardija naprezanja i spontana stenokardija. Faktori nastanka stenokardije su isti kao i kod ostalih oblika ishemijske bolesti srca.

U osnovi stenokardije je ateroskleroza koronarnih sudova, čije napade izazivaju – emocionalna i fizička opterećenost.

Među različitim metodama ispitivanja stenokardije (pokazatelji lipidne razmene, aktivnost ALT i AST, kreatin-kineza-CK, laktat-dehidrogenaza-LDH i njeni izoenzimi, faktori koagulacije, glukoze i elektroliti krvi) treba posebno naglasiti dijagnostički značaj novih markera oštećenja miokarda – troponina-L i troponina- T.

Ovo su veoma specifične miokardialne belančevine, čije određivanje može biti iskorišćeno za kasnu dijagnostiku infarkta miokarda, prognozu prilikom nestabilne stenokardije, simptoma minimalnih oštećenja miokarda (mikro-infarkta) i pojavu IBS grupe povećanog rizika među obolelim.

BIOKOREKCIJA □ STENOKARDIJE

Energetski meridijan sistema krvotoka aktivan je od 19-21

Prva faza – čišćenje krvnih sudova, smanjenje agregacije trombocita (proces obrazovanja ugrušaka krvi), obnavljanje mikrocirkulacije.

1. «ANTILIPIDNI ČAJ» ujutru sat vremena pre jela preliterati 1 kesicu čaja sa 500 ml ključale vode i ostaviti da odstoji 15 min. piti malim gutljajima tokom dana.
2. «ULJE belog luka» uzimati po 2 kapsule 2 puta na dan za vreme maksimalnog rada meridijana srca od 11 do 13 časova i perikarda od 19 do 21 časa.
3. «KORDICEPS» po 3 kapsule za vreme ručka, 30min. pre jela, popiti sa 50 ml «ANTILIPIDNOG ČAJA».
4. «BIOKALCIJUM» uzimati po jednu kafenu kašičicu sa 250 ml vode ujutru, 30 min. pre doručka, malim gutljajima.
5. «BIOCINK» po 2 kapsule za vreme ručka, sat i po posle jela, popiti sa 250 ml vode.
6. «HITIZAN» po 3 kapsule 30min. pre večere popiti sa 250 ml vode.

Predviđena doza za kuru – 2 meseca.

Druga faza – jačanje srčanog mišića i povećanje reoloških svojstava krvi.

7. «SAN GAO» uzimati po 1 kapsulu 2 puta na dan, 30 min. pre jela u periodu aktivnosti meridijana srca od 11 do 13 časova i perikarda od 19 do 21 časa.

8. «HOLIKAN» po 2 kapsule uveče, 30 min. pre jela popiti sa 250 ml «ANTILIPIDNOG ČAJA».

9. «IKAN» po 3 kapsule 30 min. pre doručka popiti sa 250 ml vode, po 2 kapsule u vreme ručka, 30 min. pre jela, popiti s vodom.

Predviđena doza za kuru – 1 mesec.

Trajanja osnovnog programa korekcije – 3 meseca.

U toku godine se sprovode najmanje 2 kure.